

平成30年度 三浦市子どもの予防接種のお知らせ



★お問い合わせ★
三浦市子ども課
電話 046-882-1111
内線338・367

予防接種実施医療機関

予防接種は感染症の効果的な予防方法です。感染症に対する免疫をつけて病気にかかりにくくしましょう。

医療機関名	所在地	電話番号	ヒブ	肺炎球菌	B型肝炎	四種混合	ポリオ	二種混合	BCG	MR	水痘	日本脳炎	実施時間	予約の要否他
あさい内科クリニック	初声町入江76-1	888-2217	○	○	○	○		○		○	○	○	診療時間内	なし
飯島医院	東岡町10-1	881-5265						○		○	○	○	診療時間内	要
栗原耳鼻咽喉科医院	南下浦町上宮田3111-2	889-1133						○		○		○	診療時間内(土除く)	要
斉田皮フ科	南下浦町上宮田3125-1	888-3401						○		○	○	○	月・火・木・金 / 9時~13時・14時30分~17時	要
塩崎産婦人科	南下浦町上宮田2994-6	889-1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	月・火・木・金 / 9~11時・15~16時 土 / 9~11時 【ポリオ・二混・おたふくは要予約】	なし
せりかわ内科クリニック	南下浦町上宮田3257-5	887-1666	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療日 / 9~11時・15~17時 BCGは予約時に日時を調整	要
田中内科医院	栄町7-11	881-4678				○		○		○	○	○	月・火・水・金 / 午前	要
徳山診療所	南下浦町上宮田2785-1	888-5115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療時間内 / 午前	要
にしやま小児科	三崎町六合315-1	881-3887	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療時間内 予防接種のみ: 火 / 14~15時	要
三浦診療所	南下浦町上宮田3263-1	889-3388				○		○	○	○	○	○	月・火 / 9~11時・15~16時30分 木・土 / 9~11時	要
三浦海岸つばさクリニック	南下浦町上宮田3230 マホロバマインズ別館1階	887-3555	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療時間内 【ポリオは要予約】	なし
みなみ湘南医院	南下浦町上宮田1528-102	889-1211				○	○	○	○	○	○	○	月・水・木 / 診療時間内	要
矢島内科医院	天神町9-16	881-2467	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療時間内	要
三浦市立病院	岬陽町4-33	882-2111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	火・水 / 午後	要 / 月~金 14~17時
小倉医院	横須賀市津久井2-17-21	848-0290	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療時間内(水 / 休診)	なし
高宮小児科	横須賀市根岸町4-3-20	837-7300	○	○	○	○	○	○		○	○	○	診療日 / 9~12時半・15~18時 (土 / 9~12時半) (休診日: 木・日・祝)	なし
横須賀市立市民病院	横須賀市長坂1-3-2	856-3136	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	火 / 14~15時	要

★予防接種に行く前に確認してください

- ①お子さんの体調が良好な時に予防接種を受けましょう。
 - ②「よくわかる予防接種のはなし」は読みましたか？(赤ちゃん訪問でお渡しします)
 - ③母子健康手帳は、必ず病院に持って行ってください。(接種時期などを確認します)
- ※ 医療機関へは、お子さんの体調がよく分かる保護者の方が同伴ください。
尚、13歳以上の年齢のお子さんで、保護者の方が同伴されない場合、保護者の同意書・予診票への記入・サインが必要になります。



★予防接種を受けた後に、接種局所のひどい腫れ、高熱引きつけなどの症状が見られる場合は接種した医療機関にご相談ください。
★極めてまれに重い副反応が生じることもあります。このような場合、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象になります。



定期接種：個別接種

○基本的に個人通知はいたしませんので、対象年齢になりましたら実施医療機関で接種してください。
○予診票は医療機関にあります。



予防接種	対象	接種開始年齢別接種回数	
ヒブ	2か月～5歳に至るまで (5歳のお誕生日の前日まで) 標準パターン 初回接種 3回 追加接種 1回	【初回接種開始時年齢が2か月～7か月未満】 初回接種：27日(医師が必要と認めるときは20日)以上において3回【標準的には56日までの間隔】 追加接種：初回接種に係る最後の注射終了後7月以上において1回【標準的には13月までの間隔】 ※ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回行うこと。	【初回接種開始時年齢が7か月～1歳未満】 初回接種：27日(医師が必要と認めるときは20日)以上において2回【標準的には56日までの間隔】 追加接種：初回接種に係る最後の注射終了後7月以上において1回【標準的には13月までの間隔】 ※ただし、初回2回目の接種は、生後1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回行うこと。
		【1歳～4歳】 1回	【1歳】 1回
肺炎球菌	2か月～5歳に至るまで (5歳のお誕生日の前日まで) 標準パターン 初回接種 3回 追加接種 1回	【初回接種開始時年齢が2か月～7か月未満】 初回接種：標準的には生後1歳までに27日以上の間隔をおいて3回 追加接種：生後1歳から生後1歳3か月を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後1歳に至った日以降において1回 ※ただし、初回2回目及び3回目の接種は生後2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能) また初回2回目の接種が生後1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと。(追加接種は実施可能)	【初回接種開始時年齢が7か月～1歳未満】 初回接種：標準的には生後1歳1か月前までに27日以上の間隔をおいて2回 追加接種：初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後1歳に至った日以降において1回 ※ただし、初回2回目の接種は生後2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能)
		【1歳】 初回接種：60日以上の間隔で2回 追加接種：【2歳～4歳】1回	【2歳～4歳】 1回
予防接種	接種回数	対象	
B型肝炎	3回	生後1歳に至るまで (標準的年齢：生後2か月から生後9か月未満 27日以上の間隔で2回 1回目終了後、139日以上(20週)の間隔をおいて1回)	
BCG	1回	生後5か月～1歳に至るまでの間 (1歳のお誕生日の前日まで) 【標準的年齢生後5か月～8か月】	
四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ)	1期初回 20日以上の間隔で3回 1期追加 1期初回(3回)接種後 6月以上の間隔をあけて1回	生後3か月～7歳6か月に至るまで (標準的年齢：1期初回 生後3か月～1歳 1期追加 初回接種終了後12～18月の間隔をおいて)	
二種混合 (ジワリ・破傷風)	1回	11～13歳未満【標準的年齢 11歳】 (13歳のお誕生日の前日まで)	
MR (麻しん 風しん混合)	1期 1回 2期 1回	1期 生後1歳～2歳に至るまで(2歳のお誕生日の前日まで) 2期 年長児に相当する年齢(H24.4.2～H25.4.1生)	
水痘 (水ぼうそう)	2回	生後1歳～3歳に至るまで (標準的年齢：初回接種 生後1歳～1歳3か月に1回 追加接種 初回接種終了後6月～12月の間隔をおいて1回)	
日本脳炎	1期初回 6日以上の間隔で2回 1期追加 1回 2期 1回	1期初回 生後6か月～7歳6か月に至るまで【標準的年齢 3歳】【標準的には6～28日の間隔】 1期追加 生後6か月～7歳6か月に至るまでに1期初回終了後、6月以上の間隔をおいて1回 【標準的年齢 4歳に達した時から5歳に達するまで】 【標準的にはおおむね1年を経過した時期】 2期 9歳～13歳未満【標準的年齢 9歳】 ※特例対象者：H10.4.2からH19.4.1に生まれた方(20歳未満の間に限る。)	

ワクチン ★生ワクチン △不活化ワクチン	乳児期					幼児期					学童期							
	2 カ 月	3 カ 月	4 カ 月	5 カ 月	6-8 カ 月	9-11 カ 月	12 カ 月	15 カ 月	18 カ 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳 以上
ヒブ (インフルエンザb型) △	①	②	③					④										
小児用肺炎球菌 △	①	②	③					④										
B型肝炎(HBV) △	①	②			③													
四種混合 (DPT-IPV) △		①	②	③					④									
二種混合(DT) △																		①11-12歳
BCG ★				①														
麻しん風しん ★								①					②					
水痘(水ぼうそう) ★								①	②									
日本脳炎 △										①②	③						④	
ヒトパピローマウイルス (HPV) (子宮頸がん) △																		①②③
ロタウイルス ★	①	②	③															
おたふくかぜ ★								①					②					
インフルエンザ △																		毎年①、②(10月、11月など) 13歳-①

生ワクチン
麻しん
風しん
BCG
水痘
ロタウイルス
おたふくかぜ

27日以上
あける

他の予防接種

**不活化
ワクチン**
四種混合
二種混合
日本脳炎
ヒブ
肺炎球菌
B型肝炎
子宮頸がん
インフルエンザ

6日以上
あける

他の予防接種

この予防接種のスケジュールは、各予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ医などと相談しましょう。
丸囲み数字(①、②など)は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。
※予防接種について詳しい情報は国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule.html>)をご確認ください。